

我们体会这是一种效果较好的综合治疗方法。

社,1996:621-697

参考文献

- [3] 孔令刚,曹繁皋.痔瘕术后使用“止血消炎液”疗效观察
四川中医,1989,5:44

[1][2] 黄乃健.中国肛肠病学.济南:山东科学技术出版

收稿日期:2000-08-30

芒黛散治疗带状疱疹 92 例临床应用

刘福元¹ 叶俊儒¹ 梁贵章¹ 孙云¹ 耿丽娟¹

1.解放军47医院(四川,新都县 610500)

关键词 带状疱疹 芒黛散 疗效

中国图书分类号 R552

我们根据民间验方配制成芒黛散,外用治疗带状疱疹,并与西药组对照,疗效满意,现报告如下。

1 临床资料

全部病例有患处红斑水疱,累累如串珠,痛如火燎。按确诊顺序随机分为两组。治疗组92例,男50例,女42例;年龄19~70岁,平均55.8岁;病程4~13d,平均5.6d。对照组46例,男26例,女20例;年龄20~73岁,平均54.0岁;病程3~11d,平均5.4d。

2 治疗方法

治疗组:用芒黛散(芒硝100g、青黛20g),加蒸馏水400ml摆匀,涂于患处,每日数次,使患处保持湿润;对照组:用聚肌胞2mg,肌肉注射,隔日1次;病毒灵0.2g,口服,每日3次。

3 结果

自觉症状消失,皮疹全部干涸结痂脱落为痊愈。两组138例均全部治愈。芒黛散组开始止痛时间0.5~2h,疼痛消失时间2~3d,皮疹开始干涸结痂时间1~3d,治愈天数3~8,平均4.6d。

对照组开始止痛时间4~5d,疼痛消失时间7~9d,皮疹开始干涸结痂时间6~8d,治愈天数7~19d,平均10.5d。两组比较,止痛时间($t=16.10, p<0.01$)、疼痛消失时间($t=13.26, p<0.01$)及皮疹干涸结痂时间($t=13.36, p<0.01$)有显著性差异。

治疗中两组间均无明显副作用。

4 讨论

带状疱疹为潜伏在体内的水痘—带状疱疹病毒在机体免疫功能下降时,病毒以一个或数个神经节沿相应神经到皮肤而引起发病。中医称“缠腰火丹”、“蛇串疮”等,多因湿热内蕴、或气郁化火,肝胆火盛,肝火相搏,阻滞经络,致气血凝滞不通,雍于肌肤,则见皮肤灼热刺痛,毒邪蕴于血分则发红斑,湿邪凝聚肌肤不得宣泄则起水疱,芒黛散具有清热解毒,凉血止痛作用。经临床观察,证实止痛效果快,有药到痛止之功效。皮疹结痂时间短,此方法简单,价廉易得,能缩短病程,无不良反应。我们认为本药可作为一种用于治疗带状疱疹的有效而安全的药物。

收稿日期:2000-10-25

日干支推算新公式

陈永华¹

1.成都军区机关医院中医科(成都 610011)

关键词 日干支 新公式 推算方法

中国图书分类号 R552

我们通过继承学习,跟师临床,亲眼看见子午流

注、灵龟八法、飞腾八法、道家针刺等时间针灸法,

在临床上应用有很好的疗效,但日干支的推算却令人头痛,按高校全国统编教材需繁杂的公式运算,又要查表,又要心算,稍有不慎,即可致错,差之毫厘,失之千里。

我们在刘正才老师的指导下,制定了推算日干支的新公式,这个公式极其简单,易于掌握,现公诸于世,为同道提供方便。

1 求日干公式

从元旦至所求日的天数 $\div 10 =$ 商 $\cdots\cdots$ 余数。

2 求日支公式

从元旦至所求日的天数 $\div 12 =$ 商 $\cdots\cdots$ 余数。

公式中10,是十干的一个周期,即10干中任何一千,每隔10天要重见一次,一年365天,要重见36次。同理,12是十二支的一个周期。任何一支每隔12天要重见一次,一年要重复见到30次。

元旦至所求日天数,是从元旦这天算起到所求之日止,一共是多少天。

余数,是指从元旦干支算起第几干或第几支。然后干支相配,便是所求日的干支。

应用此公式,须具备如下常识。

1. 按顺序背熟十干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。十二支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

2. 记住当年元旦干支。

3. 熟记一年中各月的具体天数,公历月大月小是固定的,8月以前逢单即1、3、5、7月都是大月,双月2、4、6月都是小月。8月以后逢双月即8、10、12月是大月,单月9、11月是小月。月大31天,月小30天,二月特殊,平年28天,闰年是29天,查当年日历即可知2月的天数。

例如:已知1998年元旦干支为戊申,求1998年8月1日的日干支?

按公式:从元旦至所求日天数为,31+28+31+30+31+30+31+1=213天。

代入求日干公式:213 $\div 10 = 21\cdots\cdots 3$

代入求日支公式:213 $\div 12 = 17\cdots\cdots 9$

按日干公式算余数为3,即1998年元旦干戊起第3干,按十干顺序,戊起第三干(戊,己,庚)应为庚。

按日支公式算余数为9,即1998年元旦支申起第9支,按十二支顺序申起第9支(申、酉、戌、亥、子、丑、寅、卯、辰)是辰。所以,1998年8月1日的日干支是

庚辰。

又如求1998年9月25日的日干支?

元旦至9月25日共有多少天? 31+28+31+30+31+30+31+31+25=268天。

代入求日干公式:268 $\div 10 = 26\cdots\cdots 8$

代入求日支公式:268 $\div 12 = 22\cdots\cdots 4$

可见,1998年9月25日的日干为戊起第8干乙,1998年9月25日的日支为申起第4支亥,所以,1998年9月25日的日干支为乙亥。

若已知距所求日最近的日干支,仍可按上述公式,将元旦改为“已知日”。

如已知1998年8月1日的日干支为庚辰,求1998年9月25日的日干支?

8月1日至9月25日,共31+25=56天。

代入日干公式:56 $\div 10 = 5\cdots\cdots 6$

代入日支公式:56 $\div 12 = 4\cdots\cdots 8$

1998年9月25日日干为庚起第6干乙,1998年9月25日的日支为辰起第8支亥,所以,1998年9月25日日干支为乙亥。

但有余数为1或0者,余数为1即是已知日干或支的本身。如:已知1998年9月25日日干为乙亥,求1998年10月25日的日干支?

9月25日至10月25日共(6+25)=31天。

代入求日干公式:31 $\div 10 = 3\cdots\cdots 1$

代入求日支公式:31 $\div 12 = 2\cdots\cdots 7$

余数为1即是已知日的日干本身,所以1998年10月25日的日干为乙。余数为7即1998年10月25日的日支为亥起第7支巳。

所以,1998年10月25日的日干支为乙巳。

余数为0者,是已知日干或支的前一千或前一支。如:已知1998年8月1日的日干支为庚辰,求1998年9月29日日干支?

8月1日至9月29日为(31+29)=60天。

代入求日干公式:60 $\div 10 = 6\cdots\cdots 0$

代入求日支公式:60 $\div 12 = 5\cdots\cdots 0$

日干与日支的余数都为0,所以即求1998年9月29日日干支都为已知日1998年8月1日的日干支庚辰的前一对干支巳卯。因为(庚的前一千为巳,辰的前一支为卯)。

元旦或已知日至所求日的天数不足10或12者,可不必用公式推算,按干支顺序屈指可得。

收稿日期:2000-03-26